

PRÉ-MEDICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	DILUIÇÃO	VIA ADMINISTRAÇÃO	DOSE/KG	DOSE EM ML (MENORES DOSES)
ATROPINA	0,25/ml	Sem diluir	IV/IM/TOT	0,02mg/kg (mx-1mg)	0,08ml/kg
LIDOCAINA	20mg/ml ( 20%)	Sem diluir	IV/IM/TOT	1-3mg/kg (mx-200mg)	0,05ml/kg
<b>ANALGESIA/SEDAÇÃO</b>					
FENTANIL	50 µg/ml	1ml + 9mlAD	IV/IM/nasal	1-3 µg/kg ( mx- 50 µg)	0,2ml/kg da diluição
KETAMINA	50mg/ml	Sem diluir	IV/IM/nasal	1-4mg/kg	0,02ml/kg
DEXMEDETOMIDINA	100 µg/ml	1ml +9ml AD	IV	0,5-1 µg/kg	0,05ml/kg da diluição, completar para 10ml SF 0,9% - em 10 min
KETODEX	Ketamina + Dex	Dex-1ml + Keta-2ml+ SF 0,9%-7ml	IV	1 µg/kg ( Dex)	0,1ml/kg da diluição, completar para 10ml SF 0,9% em 10 min
PROPOFOL	10mg/ml	Sem diluir	IV	1-3mg/kg	0,1ml/kg
MIDAZOLAN	5mg/ml	Sem diluir	IV	0,2-0,3mg/kg	0,04ml/kg
ETOMIDATO	2mg/ml	Sem diluir	IV	0,1-0,4mg/kg (mx-60mg)	0,1ml/kg
<b>BLOQUEADORES NM</b>					
SUCCINILCOLINA	FA 100mg	Diluir em 10ml AD	IV,IM	1-2 mg/kg	0,1ml/kg da diluição
ROCURÔNIO	10mg/ml	Sem diluir	IV,IM	0,6-1,2mg/kg	0,06ml/kg